

Таблица. Видовой состав цианобактерий в биопленках двух типов на мраморе и граните-рапакиви (виды расположены в порядке снижения встречаемости)

Table. Cyanobacteria species composition in the biofilms (2 types) on the marble and granite-*rapakivi* (taxa are arranged in decreasing order of occurrence)

| Вид | Гранит-рапакиви | | Рускеальский мрамор | |
|---|-----------------|-----|---------------------|-----|
| | Ig | IIg | Im | IIm |
| <i>Calothrix parietina</i> Thur. ex Born. & Flah. | + | + | + | + |
| <i>Leptolyngbya foveolarum</i> (Rabenhorst ex Gomont) Anagnostidis et Komarek | + | + | + | + |
| <i>Synechocystis aquatilis</i> Sauv. | + | + | + | - |
| <i>Chroococcus minor</i> (Kützing) Nägeli | + | - | + | + |
| <i>Gloeocapsopsis magma</i> (Brébisson) Komárek et Anagnostidis | - | + | + | + |
| <i>Gloeocapsa punctata</i> Näg. ampl. Hollerb. | - | + | + | + |
| <i>Gloeothece palea</i> (Kütz.) Rabenh. | - | + | + | - |
| <i>Chroococcus minutus</i> (Kützing) Nageli | - | + | + | - |
| <i>Synechocystis minuscula</i> Woronichin | - | + | + | - |
| <i>Gloeocapsa compacta</i> Kütz. | + | - | - | + |
| <i>Gloeocapsa rupestris</i> Kützing | + | + | - | - |
| <i>Gloeocapsa atrata</i> Kützing, nom. illeg. | + | + | - | - |
| <i>Calothrix</i> sp. | + | + | - | - |
| <i>Leptolyngbya angustissima</i> (West & G.S.West) Anagnostidis & Komárek | + | + | - | - |
| <i>Microcystis pulverea</i> (H.C.Wood) Forti | + | - | - | - |
| <i>Stigonema ocellatum</i> Thuret ex Bornet & Flahault (Dillw.) | + | - | - | - |
| <i>Microcoleus paludosus</i> Gomont | + | - | - | - |
| <i>Lyngbya</i> sp. | + | - | - | - |
| <i>Phormidium breve</i> (Kützing ex Gomont) Anagnostidis & Komárek | + | - | - | - |
| <i>Phormidium corium</i> Gomont ex Gomont | + | - | - | - |
| <i>Phormidium interruptum</i> Kützing ex Forti | + | - | - | - |
| <i>Phormidium papyraceum</i> (Ag.) Gom. | + | - | - | - |
| <i>Leptolyngbya perelegans</i> (Lemmermann) Anagnostidis & Komárek Lemm. | + | - | - | - |
| <i>Planktolyngbya bipunctata</i> (Lemmermann) Anagnostidis & Komárek | + | - | - | - |
| <i>Planktolyngbya limnetica</i> (Lemmermann) Komárková-Legnerová & Cronberg | + | - | - | - |
| <i>Aphanocapsa holsatica</i> (Lemmermann) G.Cronberg & Komárek | + | - | - | - |

Rodina O.A., Sazanova K.V., Vlasov D.Yu. Comparative characteristics of metabolites from various cyanobacteria biofilms. *Voprosy sovremennoi algologii [Issues of modern algology]*. 2021. № 2 (26). С. 16–23. URL: <http://algology.ru/1702>

| Вид | Гранит-рапакиви | | Рускеальский мрамор | |
|---|-----------------|-----|---------------------|-----|
| | Ig | IIg | Im | IIm |
| <i>Synechocystis parvula</i> Perfiliev [Perfiljev] | + | - | - | - |
| <i>Synechocystis salina</i> Wislouch | + | - | - | - |
| <i>Jaaginema geminatum</i> (Schwabe ex Gomont) Anagnostidis & Komárek (Menegh.) | + | - | - | - |
| <i>Chondrocystis dermochroa</i> (Nägeli) Komárek & Anagnostidis | - | + | - | - |
| <i>Johannesbaptistia pellucida</i> (Dickie) W.R.Taylor & Drouet (Dickie) Taylor et Dronet | - | + | - | - |
| <i>Johannesbaptistia schizodichotoma</i> (J.J.Copeland) Komárek & Anagnostidis | - | + | - | - |
| <i>Hapalosiphon pumilus</i> Kirchner ex Bornet & Flahault | - | + | - | - |
| <i>Cyanothece aeruginosa</i> (Nägeli) Komárek | - | + | - | - |
| <i>Phormidium inundatum</i> Kützing ex Gomont | - | + | - | - |
| <i>Leptolyngbya amplivaginata</i> (Goor) Anagnostidis & Komárek van Goor | - | + | - | - |
| <i>Leptolyngbya cebennensis</i> (Gomont) I.Umezaki & M.Watanabe | - | + | - | - |
| <i>Leptolyngbya lagerheimii</i> (Gomont ex Gomont) Anagnostidis & Komárek (Mob.) Gom. | - | + | - | - |
| <i>Aphanocapsa parietina</i> (Nägeli ex Kützing) Nägeli (Näg.) Elenk. | - | + | - | - |
| <i>Aphanocapsa muscicola</i> (Meneghini) Wille | - | + | - | - |
| <i>Cyanobium gaarderi</i> (Ålvik) Komárek, Kopecký & Cepák | - | + | - | - |
| <i>Anabaena</i> sp. | - | - | + | + |
| <i>Gloeotheca</i> sp. | - | - | + | - |
| <i>Chroococcus turgidus</i> (Kütz.) Näg. | - | - | + | - |
| <i>Phormidium puteale</i> (Montagne ex Gomont) Anagnostidis & Komárek | - | - | + | - |
| <i>Eucapsis</i> sp. | - | - | + | - |
| <i>Gloeocapsa alpina</i> Näg. Emend Brand | - | - | - | + |
| <i>Gloeocapsa</i> sp. | - | - | - | + |
| <i>Phormidium tergestinum</i> (Rabenhorst ex Gomont) Anagnostidis & Komárek | - | - | - | + |
| Всего | 24 | 24 | 14 | 10 |

Примечания: Ig – I тип биопленок на поверхности гранита-рапакиви; IIg – II тип биопленок на поверхности гранита-рапакиви; Im – I тип биопленок на поверхности мрамора; IIm – II тип биопленок на поверхности мрамора.

Notes: Ig – I type of biofilms on the surface of granite-rapakivi; IIg – II type of biofilms on the surface of granite-rapakivi; Im – I type of biofilms on the surface of marble; IIm – II type of biofilms on the surface of marble.